

BIMODULES NORMÉS REPRÉSENTABLES SUR DES ESPACES HILBERTIENS

CIPRIAN POP

1. INTRODUCTION

Soient A, B deux C^* algèbres. Les articles [1] et [3] contiennent une caractérisation abstraite des $A - B$ bimodules V ayant une structure d'espace d'opérateurs telle qu'il existe un espace de Hilbert $\mathfrak{H}$, deux représentations fidèles $\pi : A \rightarrow \mathcal{B}(\mathfrak{H})$, $\rho : B \rightarrow \mathcal{B}(\mathfrak{H})$ et une application complètement isométrique $J : V \rightarrow \mathcal{B}(\mathfrak{H})$ vérifiant

$$J(avb) = \pi(a)J(v)\rho(b), \quad \forall a \in A, b \in B, v \in V.$$

De tels bimodules interviennent dans la théorie cohomologique des algèbres d'opérateurs. Ils sont souvent appelés $A - B$ bimodules d'opérateurs. Ici nous les appellerons plutôt $A - B$ bimodules L^∞ matriciellement normés.

Etant donné un $A - B$ bimodule normé V , il est naturel de chercher des critères assurant l'existence d'une structure de $A - B$ bimodule L^∞ matriciellement normé sur V compatible avec la norme donnée sur V , c'est à dire telle que $\|\cdot\|_1 = \|\cdot\|$. Il est clair que la condition suivante, appelée condition (R) , est nécessaire:

$$\|a_1v_1b_1 + a_2v_2b_2\| \leq \|a_1a_1^* + a_2a_2^*\|^{1/2}\|b_1^*b_1 + b_2^*b_2\|^{1/2}\max\{\|v_1\|, \|v_2\|\},$$

pour tous $a_1, a_2 \in A$, $b_1, b_2 \in B$ et $v_1, v_2 \in V$.

Nous démontrons la réciproque. Plus précisément, nous démontrons qu'un $A - B$ bimodule normé satisfait à la condition (R) si et seulement si il existe un espace de Hilbert $\mathfrak{H}$, deux représentations fidèles π, ρ de A et B dans $\mathfrak{H}$ et une application isométrique de $A - B$ bimodule $j : V \rightarrow \mathcal{B}(\mathfrak{H})$ tels que

$$j(avb) = \pi(a)j(v)\rho(b), \quad \forall a \in A, b \in B, v \in V.$$

Nous dirons que de tels bimodules sont représentables ((R) comme Ruan ou Représentable). Le cas $A = B = \mathbb{M}_n$ a été traité par F. Lehner dans [8]. Le cas commutatif $A = B = C_0(X)$, où les actions à droite et à gauche coïncident est dû à K.H. Hofmann [7].

Notre travail est organisé comme suit.

On commence par démontrer quelques résultats techniques utiles pour la suite. L'ingrédient principal est le lemme fondamental 2.3, qui sert à caractériser les formes linéaires bornées sur les $A - B$ bimodules représentables.

Pour une représentation $(\pi, \mathfrak{H})$ d'une C^* -algèbre C nous introduisons la notion suivante de *cyclicité locale*.

Définition . *Soit C est une C^* -algèbre. Une représentation (π, H) de C est appelée localement cyclique si il existe $\mathcal{E} \subset H$ un sous-ensemble dense dans H tel que pour tout $h_1, h_2, \dots, h_n \in \mathcal{E}$ il existe $h \in \mathcal{E}$ tel que $h_i \in \overline{\pi(C)h}$.*

Cette propriété a été remarquée dans [10], où on considère $A, B \subset \mathcal{B}(\mathfrak{H})$ deux C^* algèbres et $V \subset \mathcal{B}(\mathfrak{H})$ un $A - B$ bimodule. Si $A \hookrightarrow \mathcal{B}(\mathfrak{H})$ et $B \hookrightarrow \mathcal{B}(\mathfrak{H})$ sont localement cycliques, Smith démontre que tout morphisme de $A - B$ bimodules $R : V \rightarrow \mathcal{B}(\mathfrak{H})$ est complètement borné, avec

$$\|R\| = \|R\|_{cb}.$$

On en déduit (à l'aide du théorème de prolongement de Wittstock) que R se prolonge en un morphisme de $A - B$ bimodule $\tilde{R}$ de $\mathcal{B}(\mathfrak{H})$ dans lui-même, avec $\|\tilde{R}\| = \|R\|$ (voir aussi [11]).

Dans la section 2 nous démontrons, sans utiliser le résultat de Wittstock, le théorème de prolongement suivant.

Théorème . *Soient $(\pi, \mathfrak{K})$ et $(\rho, \mathfrak{H})$ deux représentations localement cycliques de A et B respectivement. Soient W un $A - B$ bimodule vérifiant la propriété (R) et $V \subset W$ un sous $A - B$ bimodule. Soit*

$$R : V \rightarrow \mathcal{B}(\mathfrak{K}, \mathfrak{H})$$

un morphisme contractif de $A - B$ bimodules. Alors il existe un morphisme contractif de $A - B$ bimodules

$$\tilde{R} : W \rightarrow \mathcal{B}(\mathfrak{K}, \mathfrak{H})$$

qui prolonge R .

De plus, le théorème de Wittstock est une conséquence immédiate de ce résultat, grâce à une propriété remarquable de l'algèbre $\mathcal{K}$ des opérateurs compacts en dimension infinie, à savoir que toutes les représentations de $\mathcal{K}$ sont localement cycliques.

Dans la section 3 nous étudions les représentations des $A - B$ bimodules normés, et nous caractérisons les $A - B$ bimodules représentables comme étant exactement ceux qui possèdent la propriété (R). Si $\mathfrak{H}_{A''}$ et $\mathfrak{H}_{B''}$ désignent les espaces des représentations standards des algèbres de von Neumann enveloppantes de A'' et B'' de A et B respectivement, le $A - B$ bimodule $\mathcal{B}(\mathfrak{H}_{B''}, \mathfrak{H}_{A''})$ joue un rôle important dans notre travail ainsi que $End_{A,B}(V, \mathcal{B}(\mathfrak{H}_{B''}, \mathfrak{H}_{A''}))$, espace normé des morphismes de $A - B$ bimodules de V dans $\mathcal{B}(\mathfrak{H}_{B''}, \mathfrak{H}_{A''})$. Celui-ci généralise dans notre cadre le dual d'un espace normé ordinaire. On l'appelle le dual standard du $A - B$ bimodule V .

Etant donné un $A - B$ bimodule représentable, nous montrons dans la section 4 qu'il existe une plus petite structure L^∞ matricielle compatible, et nous donnons plusieurs caractérisations. Plus précisément, on a

Théorème . *Soit $(V, (\|\cdot\|_n)_n)$ un $A - B$ bimodule L^∞ matriciellement normé. Les affirmations suivantes sont équivalentes:*

- (a) *La structure matricielle de V est minimale.*
- (b) *Il existe Ω un compact et un morphisme de $A - B$ bimodules complètement isométrique $V \rightarrow C(\Omega, \mathcal{B}(\mathfrak{H}_{B''}, \mathfrak{H}_{A''}))$.*
- (c) *Tout morphisme isométrique $j : V \rightarrow C(\Omega, \mathcal{B}(\mathfrak{H}_{B''}, \mathfrak{H}_{A''}))$ est complètement isométrique.*
- (d) *Pour $[v_{kl}] \in \mathbb{M}_n(V)$ on a*

$$\|[v_{kl}]\|_n = \sup\left\{\left\|\sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^n a_k v_{kl} b_l\right\| : \left\|\sum_{k=1}^n a_k a_k^*\right\| \leq 1, \left\|\sum_{l=1}^n b_l^* b_l\right\| \leq 1\right\}.$$

- (e) *Pour tout $A - B$ bimodule L^∞ matriciellement normé, tout morphisme contractif de $A - B$ bimodules $W \rightarrow V$ est complètement contractif.*

Comme conséquence directe nous donnons une autre démonstration du théorème de représentation de [3].

Finalement, dans la section 5 nous reprénonnons les mêmes questions, en ajoutant des hypothèses de dualité. Nous définissons les $A - B$ bimodules représentables duaux (en enlevant la propriété (R) ce sont ceux introduits dans [6]). Nous caractérisons ces objets, avec ou sans hypothèses de normalité pour les actions de A et B .

Ces résultats seront utiles pour l'étude des produits tensoriels relatifs des bimodules représentables, actuellement en cours.

2. DÉFINITIONS ET RÉSULTATS DE BASE

Soit V un espace normé équipé d'une structure de $A - B$ bimodule, où A et B sont deux C^* -algèbres. On suppose que V est essentiel, c'est à dire que

$$\overline{AV} = \overline{VB} = V.$$

Définition 2.1. *Si pour tout $a \in A$, $b \in B$, $v \in V$ on a*

$$\|avb\| \leq \|a\| \cdot \|v\| \cdot \|b\|,$$

on dit que V est un $A - B$ bimodule normé.

Définition 2.2. *Si pour tout $a_1, a_2 \in A$, $b_1, b_2 \in B$ et $\|v_1\|, \|v_2\| \leq 1$ on a*

$$(R) \quad \|a_1 v_1 b_1 + a_2 v_2 b_2\| \leq \|a_1 a_1^* + a_2 a_2^*\|^{1/2} \cdot \|b_1^* b_1 + b_2^* b_2\|^{1/2},$$

on dit que V vérifie la propriété (R) .

Si pour tout $a_1, a_2 \in A^+$, $b_1, b_2 \in B^+$ et $\|v_1\|, \|v_2\| \leq 1$ on a

$$(R') \quad \|a_1 v_1 b_1 + a_2 v_2 b_2\| \leq \|a_1^2 + a_2^2\|^{1/2} \cdot \|b_1^2 + b_2^2\|^{1/2},$$

on dit que V vérifie la propriété (R') .

Evidemment la propriété (R) implique que V est un $A - B$ bimodule normé.

Il est facile de voir que si V est un $A - B$ bimodule normé alors pour toute unité approchée (a_α) de A et pour toute unité approchée (b_β) de B on a

$$v = \lim_{\alpha} a_\alpha v = \lim_{\beta} v b_\beta, \quad \forall v \in V.$$

Proposition 2.1. *Soit V un $A - B$ bimodule normé. Alors les propriétés (R) et (R') sont équivalentes.*

Démonstration. Evidemment (R) implique (R') . Supposons que V satisfait à la condition (R) . Soient $a_1, a_2 \in A$, $b_1, b_2 \in B$ et $v_1, v_2 \in V$ tels que $\|v_i\| \leq 1$, $i = 1, 2$. On va utiliser un résultat de [2] ou [9]. Si C est une C^* -algèbre et $c \in C$, pour tout $0 < \varepsilon < 1$ il existe un unique $c_\varepsilon \in C$ tel que $c = c_\varepsilon |c|^{1-\varepsilon}$ et $|c_\varepsilon| = |c|^\varepsilon$. Avec cette observation appliquée à a_1^* , a_2^* , b_1 et b_2 , pour tout $\varepsilon > 0$ on a

$$a_1 v_1 b_1 + a_2 v_2 b_2 = |a_1^*|^{(1-\varepsilon)} w_1 |b_1|^{(1-\varepsilon)} + |a_2^*|^{(1-\varepsilon)} w_2 |b_2|^{(1-\varepsilon)},$$

où $w_i = a'_i v_i b'_i$ avec $\|a'_i\| = \|a_i^*\|^\varepsilon$ et $\|b'_i\| = \|b_i\|^\varepsilon$, $i = 1, 2$. Soient

$$\begin{aligned} A_\varepsilon &= \| |a_1^*|^{(2-2\varepsilon)} + |a_2^*|^{(2-2\varepsilon)} \| \\ B_\varepsilon &= \| |b_1|^{(2-2\varepsilon)} + |b_2|^{(2-2\varepsilon)} \| \\ m_\varepsilon &= \max\{\|w_1\|, \|w_2\|\}. \end{aligned}$$

Par hypothèse on a

$$\|a_1 v_1 b_1 + a_2 v_2 b_2\| \leq A_\varepsilon^{1/2} B_\varepsilon^{1/2} m_\varepsilon.$$

Maintenant il suffit de remarquer que

$$\begin{aligned} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} A_\varepsilon &= \|a_1 a_1^* + a_2 a_2^*\| \\ \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} B_\varepsilon &= \|b_1^* b_1 + b_2^* b_2\| \\ \overline{\lim}_{\varepsilon \rightarrow 0} m_\varepsilon &\leq 1, \end{aligned}$$

d'où le résultat de l'énoncé. $\square$

Supposons que V est un $A - B$ bimodule vérifiant la propriété (R) et que A n'a pas d'unité. Alors il existe une action naturelle sur V de $\tilde{A}$ (la C^* -algèbre déduite de A par adjonction d'une unité), prolongeant l'action de A , définie par

$$(a \oplus \lambda)v = av + \lambda v, \quad \forall a \oplus \lambda \in \tilde{A}, v \in V.$$

On voit facilement que V devient un $\tilde{A} - B$ bimodule qui vérifie la propriété (R). La même chose est valable pour l'action à droite de B . Donc, en général, on pourra supposer que A et B possèdent des unités.

On aura besoin du résultat technique suivant, qui apparaît comme conséquence directe de [2] ou [9]

Lemme 2.2. *Soit C une C^* -algèbre. Soit $x_1, x_2, \dots, x_n \in C$ et $0 < \varepsilon < 1$. Posons $x = (\sum x_k^* x_k)^{1/2}$. Alors il existe $c_1, c_2, \dots, c_n \in C$ tels que $x_k = c_k x^{1-\varepsilon}$ pour $k = 1, 2, \dots, n$ et*

$$\sum c_k^* c_k = x^{2\varepsilon}.$$

Dans la suite nous supposons que tous les bimodules considérés seront supposés qu'ils satisfont la propriété (R).

Un résultat clé est le suivant:

Lemme 2.3 (fondamental). *Soit $F \in V^*$. Alors $\|F\| \leq 1$ si et seulement si il existent $\phi \in S(A)$, $\psi \in S(B)$ deux états de A et respectivement de B tels que*

$$|F(avb)| \leq \phi(aa^*)^{1/2} \psi(b^*b)^{1/2} \|v\|,$$

pour tous $a \in A$, $b \in B$ et $v \in V$.

Des variantes se trouvent dans [4, theorem C] et [8].

Démonstration. La condition est évidemment suffisante.

Supposons que $\|F\| = 1$. Soit $C = A \oplus B$. Pour $c = a \oplus b \in C^+ = A^+ \oplus B^+$ posons

$$G(c) = \sup_{\|v\| \leq 1} |F(a^{1/2} v b^{1/2})|.$$

Evidemment $0 \leq G(c) \leq \|a^{1/2}\| \cdot \|b^{1/2}\| \leq \max\{\|a\|, \|b\|\} = \|c\|$. On va prouver que G est concave sur C^+ . Soit $c_i = a_i \oplus b_i \in C^+$, $i = 1, 2$. Soit $v_1, v_2 \in V_1$. Quitte à remplacer v_1 et v_2 par $\lambda_1 v_1$ et $\lambda_2 v_2$ avec $|\lambda_i| = 1$, on peut supposer que $F(a_i v_i b_i) \geq 0$, $i = 1, 2$.

Soit $a = a_1 + a_2$, $b = b_1 + b_2$. Fixons $\varepsilon > 0$. Par le lemme 2.2 il existe $e_1, e_2 \in A$ et $f_1, f_2 \in B$ tels que

$$\begin{aligned} a_1^{1/2} &= a^{(1-\varepsilon)/2} e_1, & a_2^{1/2} &= a^{(1-\varepsilon)/2} e_2, & e_1 e_1^* + e_2 e_2^* &= a^\varepsilon, \\ b_1^{1/2} &= f_1 b^{(1-\varepsilon)/2}, & b_2^{1/2} &= f_2 b^{(1-\varepsilon)/2}, & f_1^* f_1 + f_2^* f_2 &= b^\varepsilon. \end{aligned}$$

Alors

$$F(a_1^{1/2} v_1 b_1^{1/2}) + F(a_2^{1/2} v_2 b_2^{1/2}) = F(a^{(1-\varepsilon)/2} w b^{(1-\varepsilon)/2}),$$

où

$$w = e_1 v_1 f_1 + e_2 v_2 f_2.$$

Mais alors $\|w\| \leq \|e_1 e_1^* + e_2 e_2^*\|^{1/2} \cdot \|f_1^* f_1 + f_2^* f_2\|^{1/2} = \|a\|^{\varepsilon/2} \|b\|^{\varepsilon/2}$. En passant à la limite pour $\varepsilon \rightarrow 0$ on trouve

$$F(a_1^{1/2} v_1 b_1^{1/2}) + F(a_2^{1/2} v_2 b_2^{1/2}) \leq G(c_1 + c_2), \quad \forall \|v_1\|, \|v_2\| \leq 1,$$

et donc

$$G(c_1) + G(c_2) \leq G(c_1 + c_2).$$

Si $c_i \in C^+$, $i = 1, 2$, alors

$$\|c_1\| - G(c_2) \geq \|c_2\| - \|c_1 - c_2\| - G(c_2) \geq -\|c_1 - c_2\|.$$

Soit $H : C_{sa} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$H(h) = \inf\{\|c_1\| - G(c_2) : h = c_1 - c_2 \text{ avec } c_1, c_2 \in C^+\}.$$

Alors H est une forme sous-linéaire sur C_{sa} et par le théorème de Hahn-Banach il existe une forme $\mathbb{R}$ -linéaire ρ définie sur C_{sa} telle que $\rho(h) \leq H(h)$, $\forall h \in C_{sa}$. En particulier, si $c \in C^+$ on aura $\rho(c) \leq \|c\|$ et $-\rho(c) = \rho(-c) \leq -G(c)$ pour tout $c \in C^+$. Donc

$$G(c) \leq \rho(c) \leq \|c\|, \quad \forall c \in C^+.$$

Alors l'extension complexe de ρ à C est un état de C , car si A et B sont unifères on a

$$1 = G(1) \leq \rho(1) \leq \|1\| = 1,$$

sinon on a toujours

$$\sup_{c \in C^+, \|c\| \leq 1} G(c) = 1.$$

Maintenant on pose $s = \rho(1 \oplus 0)$, $t = \rho(0 \oplus 1)$. On remarque que $s + t = 1$. En outre, $s, t > 0$, parce que $F \neq 0$. Soit $\phi(a) = s^{-1}\rho(a \oplus 0)$, $\psi(b) = t^{-1}\rho(0 \oplus b)$. Alors $\phi \in S(A)$, $\psi \in S(B)$ et

$$|F(avb)| \leq \rho(a^2 \oplus b^2) = s\phi(a^2) + t\psi(b^2) \quad \forall a \in A^+, b \in B^+, \|v\| \leq 1,$$

et par le même raisonnement qu'à la Proposition 2.1 on trouve que pour tout $a \in A$, $b \in B$ et $\|v\| \leq 1$ on a

$$|F(avb)| \leq s\phi(aa^*) + t\psi(b^*b).$$

Par un argument standard on trouve que

$$|F(avb)| \leq 2\sqrt{st}\phi(aa^*)^{1/2}\psi(b^*b)^{1/2}\|v\| \quad \forall a \in A, b \in B, v \in V.$$

Mais $st \leq 1/4$, donc le lemme est démontré. En fait, comme on a supposé $\|F\| = 1$ on a automatiquement $st = 1/4$, donc $s = t = 1/2$. $\square$

Lemme 2.4. Soit W un $A - B$ bimodule vérifiant la condition (R) et $V \subset W$ stable par les actions de A et B . Soit $\phi \in S(A)$ et $\psi \in S(B)$ deux états de A et B respectivement, et $F \in V^*$ une fonctionnelle linéaire vérifiant, pour tout $a \in A$, $b \in B$ et $v \in V$,

$$|F(avb)| \leq \phi(aa^*)^{1/2}\psi(b^*b)^{1/2}\|v\|.$$

Alors il existe $\tilde{F} \in W^*$ une extension de F telle que pour tout $a \in A$, $b \in B$ et $w \in W$ on a

$$|F(awb)| \leq \phi(aa^*)^{1/2} \psi(b^*b)^{1/2} \|w\|.$$

Démonstration. On peut supposer A et B unifères. Considérons $N : W \rightarrow \mathbb{R}_+$ l'application donnée par

$$N(w) = \inf_{w=aw'b} \frac{\phi(aa^*) + \psi(b^*b)}{2} \|w'\|.$$

En utilisant le lemme 2.2 on obtient que

$$N(w) = \inf \left\{ \frac{\phi(a^2) + \psi(b^2)}{2} \|w'\|, w = aw'b, a \in A^+, b \in B^+ \right\},$$

et finalement, pour tout $w \in W$ on a

$$N(w) = \inf \left\{ \frac{\phi(a^2) + \psi(b^2)}{2} \|w'\|, w = aw'b, a \in \mathcal{I}(A^+), b \in \mathcal{I}(B^+) \right\},$$

où on $\mathcal{I}(A^+)$ et $\mathcal{I}(B^+)$ représentent les éléments positifs et inversibles de A et B respectivement. Avec les mêmes arguments que dans la démonstration de la lemme 2.3 on vérifie que N est une semi-norme sur W , et en utilisant la dernière forme de N , on obtient que

$$|F(v)| \leq N(v), \quad \forall v \in V.$$

Par le théorème de Hahn–Banach il existe une forme linéaire $\tilde{F} \in W^*$ qui prolonge F telle que

$$|\tilde{F}(w)| \leq N(w) \quad \forall w \in W.$$

La forme $\tilde{F}$ vérifie toutes les conditions requises. $\square$

Si $(\pi, \mathfrak{H})$ et $(\rho, \mathfrak{K})$ sont deux représentations de A et B respectivement, $\mathcal{B}(\mathfrak{K}, \mathfrak{H})$ sera toujours muni de sa structure de A – B bimodule canonique, par les actions naturelles

$$a.T.b = \pi(a)T\rho(b).$$

Evidemment $\mathcal{B}(\mathfrak{K}, \mathfrak{H})$ possède la propriété (R).

Définition 2.3. Soit C est une C^* -algèbre. Une représentation (π, H) de C est appelée localement cyclique si il existe $\mathcal{E} \subset H$ un sous-ensemble dense dans H tel que pour tout $h_1, h_2, \dots, h_n \in \mathcal{E}$ il existe $h \in \mathcal{E}$ avec $h_i \in \overline{\pi(C)h}$, $i = 1, \dots, n$. On dira que $\mathcal{E}$ est un sousensemble localement cyclique de H .

Les représentations localement cycliques jouent un rôle crucial dans ce travail. Dans [10] il est démontré que, pour une algèbre de von Neumann M agissant sur l'espace de Hilbert H , l'inclusion de M dans $\mathcal{B}(H)$ est localement cyclique si tout état normal de M' est un état vectoriel. En particulier, si M est une algèbre de von Neumann, sa

représentation standard est localement cyclique. Pour une C^* algèbre A , sa représentation sur l'espace de Hilbert standard de son algèbre de von Neumann enveloppante A'' est aussi localement cyclique.

Théorème 2.5. *Soient $(\pi, \mathfrak{K})$ et $(\rho, \mathfrak{H})$ deux représentations localement cycliques de A et B respectivement. Soient W un $A-B$ bimodule vérifiant la propriété (R) et $V \subset W$ un sous $A-B$ bimodule. Soit*

$$R : V \rightarrow \mathcal{B}(\mathfrak{K}, \mathfrak{H})$$

un morphisme contractif de $A-B$ bimodules. Alors il existe un morphisme contractif de $A-B$ bimodules

$$\tilde{R} : W \rightarrow \mathcal{B}(\mathfrak{K}, \mathfrak{H})$$

qui prolonge R .

Démonstration. Soit $\mathcal{F} \subset \mathfrak{K}$ et $\mathcal{E} \subset \mathfrak{H}$ des sous ensembles denses dans $\mathfrak{K}$ et $\mathfrak{H}$ respectivement, satisfaisant aux conditions de localement cyclicité. On définit sur $\mathcal{F} \times \mathcal{E}$ une relation d'ordre par

$$(\eta, \xi) \prec (\eta', \xi') \Leftrightarrow \eta \in \overline{\rho(B)\eta'}, \xi \in \overline{\pi(A)\xi'}.$$

Pour (η, ξ) donné, on considère la forme sur V

$$F_{\eta, \xi}(v) = (R(v)\eta|\xi).$$

Par le lemme 2.4 il existe une forme linéaire $\tilde{F} \in W^*$ qui prolonge $F_{\eta, \xi}$ telle que

$$|\tilde{F}(awb)| \leq \|\pi(a)^*\xi\| \cdot \|\rho(b)\eta\| \cdot \|w\|, \quad \forall a \in A, b \in B, w \in W.$$

Donc pour chaque $w \in W$ on peut définir un opérateur

$$R_{\eta, \xi}(w) \in \mathcal{B}(\overline{\rho(B)\eta}, \overline{\pi(A)\xi})$$

par

$$(R_{\eta, \xi}(w)\rho(b)\eta|\pi(a)\xi) = \tilde{F}_{\eta, \xi}(a^*wb).$$

Mais la relation d'ordre introduite auparavant est filtrante croissante, car les deux représentations sont par hypothèse localement cycliques. Soit $\mathcal{U}$ un ultrafiltre la contenant. Alors, pour $w \in W$ fixé, on définit la forme sesquilinéaire

$$\Phi_w(\eta_0, \xi_0) = \lim_{\mathcal{U}} (R_{\eta, \xi}(w)\eta_0|\xi_0)$$

sur $\mathfrak{K} \times \mathfrak{H}$. On montre assez facilement que Φ_w définit un opérateur

$$\tilde{R}(w) \in \mathcal{B}(\mathfrak{K}, \mathfrak{H})$$

et que $w \mapsto \tilde{R}(w)$ vérifie les conditions requises. $\square$

Le théorème de prolongement ci-dessus n'est pas valable pour un morphisme de $A-B$ bimodules arbitraire $R : V \rightarrow \mathcal{B}(\mathfrak{K}, \mathfrak{H})$, même sous les hypothèses les plus simples $A = B = \mathbb{C}$.

Il semble que l'hypothèse de cyclicité locale de π et ρ soit essentielle. Cependant, le théorème de Wittstock nous dit que, si V est un espace d'opérateurs, si $T : V \rightarrow \mathcal{B}(H)$ est une application *complètement bornée* et si $V \subset W$ complètement isométriquement, alors il existe un prolongement $\tilde{T} : W \rightarrow \mathcal{B}(H)$ avec $\|\tilde{T}\|_{cb} = \|T\|_{cb}$. Ceci est valable sans aucune hypothèse sur l'espace de Hilbert H . La raison pour cela est que, si on note $\mathcal{K}$ l'algèbre des opérateurs compacts sur l^2 , alors toutes les représentations nondégénérées de $\mathcal{K}$ sont localement cycliques. En outre, si C est une C^* algèbre quelconque et $(\pi, \mathfrak{H})$ est une représentation nondégénérée de C , alors $(\text{id} \otimes \pi, l^2 \otimes \mathfrak{H})$ est une représentation localement cyclique de $\mathcal{K} \otimes C$.

Dans la suite, pour une W^* -algèbre M on va noter par $\mathfrak{H}_M$ l'espace de Hilbert de la représentation standard de M (cf.[5]). Le fait important est que tout état normal d'une algèbre de von Neumann sous forme standard est un état vectoriel.

Si C est une C^* algèbre, alors C sera identifiée avec l'image dans C'' de l'inclusion canonique (où C'' est son algèbre de von Neumann enveloppante).

Proposition 2.6. *Soit $F \in V_1^*$. Alors il existe $\eta \in \mathfrak{H}_{B''}$ et $\xi \in \mathfrak{H}_{A''}$ de norme 1, $R : V \rightarrow \mathcal{B}(\mathfrak{H}_{B''}, \mathfrak{H}_{A''})$ un morphisme contractif de A - B bimodules tels que*

$$F(\cdot) = (R(\cdot)\eta|\xi).$$

Démonstration. Par le lemme 2.3 il existe des états φ et ψ de A et B respectivement, satisfaisant à

$$|F(avb)| \leq \varphi(aa^*)^{1/2} \|v\| \psi(b^*b)^{1/2}, \quad \forall v \in V, a \in A, b \in B.$$

Les extensions φ^{**} et ψ^{**} sur A'' et B'' respectivement sont des états normaux, qu'on note aussi φ et ψ . Par [5, Theorem 2.17] ce sont des états vectoriels, c'est à dire qu'il existe des vecteurs (de norme 1) $\xi \in \mathfrak{H}_{A''}$, $\eta \in \mathfrak{H}_{B''}$ tels que $\varphi = \omega_\xi$, $\psi = \omega_\eta$. On définit sur $B\eta \times A\xi$ la forme sesquilinéaire

$$(b\eta, a\xi) \mapsto F(a^*vb),$$

qui est bien définie, car

$$|F(a^*vb)| \leq \|v\| \varphi(a^*a)^{1/2} \psi(b^*b)^{1/2} = \|v\| \cdot \|b\eta\| \cdot \|a\xi\|.$$

Pour chaque $v \in V$ il existe donc un unique opérateur

$$R(v) \in \mathcal{B}(\overline{B\eta}, \overline{A\xi})$$

de norme inférieure ou égale à $\|v\|$ tel que

$$(R(v)b\eta|a\xi) = F(a^*vb), \quad \forall (a, b) \in A \times B.$$

Comme $\overline{B\eta} \subset \mathfrak{H}_{B''}$ et $\overline{A\xi} \subset \mathfrak{H}_{A''}$ on peut regarder $R(v)$ comme morphisme de $\mathfrak{H}_{B''}$ à $\mathfrak{H}_{A''}$, noté toujours par $R(v)$. On voit facilement que

R est un morphisme de A – B bimodules, car

$$\begin{aligned} (R(avb)b_1\eta|a_1\xi) &= F(a_1^*avbb_1) \\ &= (R(v)bb_1\eta|a^*a_1\xi) \\ &= (aR(v)bb_1\eta|a_1\xi), \end{aligned}$$

et donc

$$R(avb) = aR(v)b \quad \forall a \in A, b \in B, v \in V.$$

□

3. REPRESENTATIONS DE $A - B$ BIMODULES

Soit V un $A - B$ bimodule normé.

Définition 3.1. Soit $(\pi, \mathfrak{H})$, $(\rho, \mathfrak{K})$ deux représentations fidèles de A et B respectivement et Ω un espace compact. Soit $J : V \rightarrow C(\Omega, \mathcal{B}(\mathfrak{K}, \mathfrak{H}))$ un morphisme de $A - B$ bimodules. Un tel triplet (J, π, ρ) est appelé une représentation du $A - B$ bimodule V .

Pour simplifier les notations, lorsqu'il n'y a pas de risque de confusion on va identifier A et B avec leurs images dans $\mathcal{B}(\mathfrak{H})$ et $\mathcal{B}(\mathfrak{K})$ respectivement.

Définition 3.2. Soient $(\pi, \mathfrak{H})$, $(\rho, \mathfrak{K})$ des représentations de A et B respectivement. On appelle dual associé à (π, ρ) l'espace

$$End_{A,B}(V, \mathcal{B}(\mathfrak{K}, \mathfrak{H})),$$

noté $V_{(\pi, \rho)}^\dagger$. L'espace

$$End_{A,B}(V, \mathcal{B}(\mathfrak{H}_{B''}, \mathfrak{H}_{A''}))$$

est appelé le dual standard de V , noté $V^\dagger$.

Si $A = B = \mathbb{C}$ alors le dual standard coïncide avec le dual usuel. Si $A = B$ est une C^* algèbre, alors $V = A$ possède une structure de $A - A$ bimodule (par multiplications). En fait A est toujours un $M(A) - M(A)$ bimodule vérifiant la propriété (R). Si $(\pi, \mathfrak{H})$ est une représentation de A , alors $V_{(\pi, \pi)}^\dagger$ s'identifie avec $\pi(A)'$.

Si V est un $A - B$ bimodule normé, $V_{(\pi, \rho)}^\dagger$ possède une structure naturelle de $\pi(A)' - \rho(B)'$ bimodule, et il vérifie la propriété (R) relativement à $\pi(A)'$ et $\rho(B)'$. Les actions de $\pi(A)'$ et $\rho(B)'$ sont définies par

$$(a'.T.b')(v) = a'T(v)b', \quad \forall v \in V, a' \in \pi(A)', b' \in \pi(B)'.$$

Pour un $A - B$ bimodule normé V on va noter

$$(1) \quad \Omega_V = End_{A,B}(V, \mathcal{B}(\mathfrak{H}_{B''}, \mathfrak{H}_{A''}))_1$$

l'ensemble des morphismes de $A - B$ bimodules contractifs de V à valeurs dans $\mathcal{B}(\mathfrak{H}_{B''}, \mathfrak{H}_{A''})$. Autrement dit, Ω_V est la boule unité du

dual standard de V . Il est facile de voir que Ω_V est compact pour la topologie de la convergence simple de V dans $\mathcal{B}(\mathfrak{H}_{B''}, \mathfrak{H}_{A''})$, muni de la topologie $*$ -faible.

On remarque que

$$J_V : V \rightarrow C(\Omega_V, \mathcal{B}(\mathfrak{H}_{B''}, \mathfrak{H}_{A''}))$$

définie par $J_V(v)(R) = R(v)$ est une représentation de A – B bimodules, appelée *représentation standard* de V .

Théorème 3.1. *Soit V un A – B -bimodule possédant la propriété (R) . Soit $v \in V$. Alors*

$$\|v\| = \sup\{\|R(v)\| \quad : \quad R \in \Omega_V\}.$$

Démonstration. Soit $F \in V_1^*$ telle que $F(v) = 1$. Alors par la proposition 2.6 le résultat est immédiat. $\square$

Corollaire 3.2. *Si V est un A – B bimodule possédant la propriété (R) , la représentation standard $J_V : V \rightarrow C(\Omega_V, \mathcal{B}(\mathfrak{H}_{B''}, \mathfrak{H}_{A''}))$ est une isométrie*

On peut maintenant énoncer le résultat suivant.

Théorème 3.3. *Soit V un A – B bimodule normé. Alors les conditions suivantes sont équivalentes:*

- (1) *V est un A – B bimodule possédant la propriété (R) (ou (R')).*
- (2) *La représentation standard est une isométrie.*
- (3) *Il existe une représentation isométrique de V .*
- (4) *Il existe un espace de Hilbert H , deux représentations fidèles $\pi : A \rightarrow \mathcal{B}(H)$, $\rho : B \rightarrow \mathcal{B}(H)$ et un morphisme isométrique $J : V \rightarrow \mathcal{B}(H)$ tel que*

$$J(avb) = \pi(a)J(v)\rho(b) \quad , \forall a \in A, v \in V, b \in B.$$

Démonstration. L'implication (1) $\Rightarrow$ (2) résulte du théorème 3.1. Les implications (4) $\Rightarrow$ (1) et (2) $\Rightarrow$ (3) sont immédiates.

Pour montrer que (3) implique (4), considérons J_0 un morphisme isométrique de V dans $C(\Omega, \mathcal{B}(\mathfrak{K}, \mathfrak{H}))$. On prends simplement $H_0 = \mathfrak{H} \oplus \mathfrak{K}$, les représentations $\pi \oplus 0$ et $0 \oplus \rho$ et $J(v) = \begin{bmatrix} 0 & J_0(v) \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$. Donc J vérifie les conditions requises et est à valeurs dans $C(\Omega, \mathcal{B}(H))$, qui est une C^* -algèbre. $\square$

Définition 3.3. *Un A – B bimodule qui possède ces propriétés équivalentes sera dit A – B bimodule représentable.*

On finit cette section par une caractérisation des inclusions de A – B bimodules représentables.

Par analogie avec le cas classique des espaces de Banach, pour tout morphisme de $A - B$ bimodules $T : V \rightarrow W$ on peut définir le morphisme dual $T^\dagger : W^\dagger \rightarrow V^\dagger$ par

$$T^\dagger(S)(v) = S(T(v)), \quad \forall S \in W^\dagger, v \in V.$$

On obtient:

Corollaire 3.4. *Soit $J : V \rightarrow W$ un morphisme de $A - B$ bimodules représentables. Alors les affirmations suivantes sont équivalentes:*

- (i) J est une isométrie.
- (ii) $J^\dagger(\Omega_W) = \Omega_V$ (en particulier $J^\dagger$ est surjective).

Démonstration. Pour démontrer que (i) implique (ii), soit $R \in \Omega_W$. Alors

$$J^\dagger(R)(v) = R(J(v)), \quad \forall v \in V,$$

donc

$$\|J^\dagger(R)(v)\| \leq \|J(v)\| = \|v\|, \quad \forall v \in V.$$

On a donc $J^\dagger(\Omega_W) \subset \Omega_V$.

Il reste à remarquer que, si on identifie V à son image $J(V)$, pour tout $R \in \Omega_V$, par le théorème 2.5 il existe $\tilde{R} \in W^\dagger$ le prolongeant, avec $\|\tilde{R}\| = \|R\|$. Autrement dit,

$$\tilde{R}(J(v)) = R(v), \quad \forall v \in V,$$

d'où $J^\dagger(\tilde{R}) = R$, donc $J^\dagger(\Omega_W) = \Omega_V$.

Supposons maintenant que $J^\dagger(\Omega_W) = \Omega_V$. Par le théorème 3.1 on a

$$\begin{aligned} \|v\| &= \sup_{R \in \Omega_V} \|R(v)\| \\ &= \sup_{R \in J(\Omega_W)} \|R(v)\| = \sup_{S \in \Omega_W} \|S(J(v))\| \\ &= \|J(v)\|, \end{aligned}$$

donc J est une isométrie. □

4. BIMODULES L^∞ MATRICIELLEMENT NORMÉS

Définition 4.1. *Soit V un $A - B$ bimodule. On dit que V est L^∞ matriciellement normé s'il est équipé d'une structure d'espace d'opérateurs vérifiant les axiomes de Ruan:*

$$(R1) \quad \|\tilde{a}\tilde{v}\tilde{b}\|_n \leq \|\tilde{a}\| \cdot \|\tilde{v}\|_n \cdot \|\tilde{b}\|$$

$$(R2) \quad \left\| \begin{bmatrix} \tilde{v} & 0 \\ 0 & \tilde{w} \end{bmatrix} \right\|_{n+m} = \max\{\|\tilde{v}\|_n, \|\tilde{w}\|_m\},$$

pour tout $n, m \geq 1$, $\tilde{a} \in \mathbb{M}_n(A)$, $\tilde{v} \in \mathbb{M}_n(V)$, $\tilde{w} \in \mathbb{M}_m(V)$, $\tilde{b} \in \mathbb{M}_m(B)$.

Remarque 4.1. Soit V un $A - B$ bimodule et pour tout n entier soit $\|\cdot\|_n$ une norme sur $\mathbb{M}_n(V)$. Alors $(V, (\|\cdot\|_n)_n)$ est un $A - B$ bimodule L^∞ matriciellement normé si et seulement si

1. Pour tout entiers $n < m$ l'inclusion naturelle

$$\mathbb{M}_n(V) \subset \mathbb{M}_m(V)$$

est une isométrie.

2. Pour tout n entier, $\mathbb{M}_n(V)$ est un $\mathbb{M}_n(A) - \mathbb{M}_n(B)$ bimodule représentable.

Proposition 4.2. Soit $R : V \rightarrow \mathcal{B}(K, H)$ un morphisme contractif de $A - B$ bimodules, tel que les représentations de A sur H , respectivement de B sur K , sont localement cycliques.

Alors pour tout $\tilde{v} \in \mathbb{M}_n(V)$, on a l'inégalité suivante

$$\|R_n(\tilde{v})\| \leq \sup\left\{\left\|\sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^n a_k v_{kl} b_l\right\|, \left\|\sum_{k=1}^n a_k a_k^*\right\| \leq 1, \left\|\sum_{l=1}^n b_l^* b_l\right\| \leq 1\right\}.$$

Démonstration. Pour calculer la norme de $R_n(\tilde{v})$ il suffit de considérer des vecteurs de la forme

$$\tilde{\eta} = \oplus b_k \eta, \quad \tilde{\xi} = \oplus a_k \xi,$$

avec $\|\tilde{\eta}\| \leq 1$, $\|\tilde{\xi}\| \leq 1$ et η, ξ appartenant à des sousensembles localement cycliques de K et H respectivement. Soit $a = (\sum_k a_k a_k^*)^{1/2}$ et $b = (\sum_k b_k^* b_k)^{1/2}$. Par le lemme 2.3, pour tout $0 < \varepsilon < 1$ il existe $c_1, c_2, \dots, c_n \in A$, $d_1, d_2, \dots, d_n \in B$ tels que $a_k = c_k a^{1-\varepsilon}$, $b_k = d_k b^{1-\varepsilon}$ pour $k = 1, 2, \dots, n$ et

$$\sum_k c_k^* c_k = a^{2\varepsilon}, \quad \sum_k d_k^* d_k = b^{2\varepsilon}.$$

On remarque que

$$\|b\eta\| = \|\tilde{\eta}\|, \quad \|a\xi\| = \|\tilde{\xi}\|.$$

D'autre part

$$(R_n(\tilde{v})\tilde{\eta}|\tilde{\xi}) = (R(\sum_{kl} c_k^* v_{kl} d_l) b^{1-\varepsilon} \eta | a^{1-\varepsilon} \xi),$$

donc

$$|(R_n(\tilde{v})\tilde{\eta}|\tilde{\xi})| \leq \left\|\sum_{kl} c_k^* v_{kl} d_l\right\| \cdot \|b^{1-\varepsilon} \eta\| \cdot \|a^{1-\varepsilon} \xi\|.$$

Pour obtenir le résultat il suffit de passer à la limite pour $\varepsilon \rightarrow 0$. $\square$

Définition 4.2. Soit V un $A - B$ bimodule normé. On dit qu'une structure $(V, (\|\cdot\|_n)_n)$ de $A - B$ bimodule L^∞ matriciellement normé est compatible si $\|\cdot\|_1 = \|\cdot\|$.

Il est clair que V est un $A-B$ bimodule représentable si et seulement si on peut munir V d'une structure de bimodule L^∞ matriciellement normé compatible. Nous allons voir que parmi toutes les structures de $A-B$ bimodules L^∞ matriciellement normés compatibles avec V il existe une structure minimale et une structure maximale (qu'on va caractériser).

Théorème 4.3. *Soit V un $A-B$ bimodule représentable. Pour chaque entier $n \geq 1$ on définit sur $\mathbb{M}_n(V)$*

(2)

$$N_n(\tilde{v}) = \sup \left\{ \left\| \sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^n a_k v_{kl} b_l \right\| : \left\| \sum_{k=1}^n a_k a_k^* \right\| \leq 1, \left\| \sum_{l=1}^n b_l^* b_l \right\| \leq 1 \right\}.$$

Alors N_n est une norme pour tout n , $N_1(\cdot) = \|\cdot\|$ et $(V, (N_n)_n)$ est un $A-B$ bimodule L^∞ matriciellement normé. De plus, si $(V, (N'_n)_n)$ est un $A-B$ bimodule L^∞ matriciellement normé avec $N'_1(\cdot) = \|\cdot\|$, alors $N_n \leq N'_n$, pour tout $n \geq 1$.

Démonstration. On vérifie facilement par calcul direct que N_n est une norme et que $N_1(v) = \|v\|$ pour tout $v \in V$. Pour $n \geq 1$ soit $\tilde{v} \in \mathbb{M}_n(V)$, $\tilde{\alpha} \in \mathbb{M}_n(A)$ et $\tilde{\beta} \in \mathbb{M}_n(B)$. Soit $a_1, a_2, \dots, a_n \in A$ et $b_1, b_2, \dots, b_n \in B$ satisfaisant à $\left\| \sum a_k a_k^* \right\|, \left\| \sum b_k^* b_k \right\| \leq 1$. On note

$$a = \begin{bmatrix} a_1 & \cdots & a_n \end{bmatrix} \in \mathbb{M}_{1n}(A) \text{ et } b = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} \in \mathbb{M}_{n1}(B). \text{ On aura}$$

$$\begin{aligned} \|a \cdot (\tilde{\alpha} \tilde{v} \tilde{\beta}) \cdot b\| &\leq \|a \tilde{\alpha}\| \cdot N_n(\tilde{v}) \cdot \|\tilde{\beta} b\| \\ &\leq \|\tilde{\alpha}\| \cdot N_n(\tilde{v}) \cdot \|\tilde{\beta}\|, \end{aligned}$$

d'où

$$(3) \quad N_n(\tilde{\alpha} \tilde{v} \tilde{\beta}) \leq \|\tilde{\alpha}\| \cdot N_n(\tilde{v}) \cdot \|\tilde{\beta}\|.$$

Soient $p, q \geq 1$, $\tilde{v} \in \mathbb{M}_p(V)$ et $\tilde{w} \in \mathbb{M}_q(V)$. On note comme d'habitude $\tilde{v} \oplus \tilde{w} = \begin{bmatrix} \tilde{v} & 0 \\ 0 & \tilde{w} \end{bmatrix} \in \mathbb{M}_{p+q}(V)$. D'abord on voit facilement que

$$(4) \quad \max\{N_p(\tilde{v}), N_q(\tilde{w})\} \leq N_{p+q}(\tilde{v} \oplus \tilde{w}).$$

Soit $a_1, \dots, a_p, \dots, a_{p+q} \in A$, $b_1, \dots, b_p, \dots, b_{p+q} \in B$ satisfaisant à

$$\left\| \sum a_k a_k^* \right\|, \left\| \sum b_k^* b_k \right\| \leq 1.$$

Posons

$$\begin{aligned} a^1 &= \begin{bmatrix} a_1 & \cdots & a_p \end{bmatrix} & a^2 &= \begin{bmatrix} a_{p+1} & \cdots & a_{p+q} \end{bmatrix}, \\ b^1 &= \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_p \end{bmatrix} & b^2 &= \begin{bmatrix} b_{p+1} \\ \vdots \\ b_{p+q} \end{bmatrix}, \end{aligned}$$

Soit $u = \begin{bmatrix} a^1 & a^2 \end{bmatrix} \cdot (\tilde{v} \oplus \tilde{w}) \cdot \begin{bmatrix} b^1 \\ b^2 \end{bmatrix} = a^1 \cdot \tilde{v} \cdot b^1 + a^2 \cdot \tilde{w} \cdot b^2$. On doit démontrer que

$$(5) \quad \|a^1 \cdot \tilde{v} \cdot b^1 + a^2 \cdot \tilde{w} \cdot b^2\| \leq \max\{N_p(\tilde{v}), N_q(\tilde{w})\}$$

D'après le théorème 3.1, pour tout $\varepsilon > 0$ il existe $R : V \rightarrow B(\mathfrak{H}_{B''}, \mathfrak{H}_{A''})$, un morphisme contractif de A - B bimodules, avec $\|R(u)\| > \|u\| - \varepsilon$. Alors

$$\begin{aligned} \|u\| - \varepsilon &< \|R(a^1 \cdot \tilde{v} \cdot b^1 + a^2 \cdot \tilde{w} \cdot b^2)\| \\ &= \|\pi(a^1)R_p(\tilde{v})\rho(b^1) + \pi(a^2)R_q(\tilde{w})\rho(b^2)\| \\ &= \left\| \begin{bmatrix} \pi(a^1) & \pi(a^2) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R_p(\tilde{v}) & 0 \\ 0 & R_q(\tilde{w}) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \rho(b^1) \\ \rho(b^2) \end{bmatrix} \right\| \\ &\leq \max\{\|R_p(\tilde{v})\|, \|R_q(\tilde{w})\|\} \\ &\leq \max\{N_p(\tilde{v}), N_q(\tilde{w})\}. \end{aligned}$$

La minimalité de $(V, (\|\cdot\|_n)_n)$ est immédiate. Soit $(V, (N'_n)_n)$ un A - B bimodule L^∞ matriciellement normé compatible avec V . Soient $a_1, \dots, a_n \in A$, $b_1, \dots, b_n \in B$ telles que $\|\sum_k a_k a_k^*\| \leq 1$, $\|\sum_k b_k^* b_k\| \leq 1$ et soit $[v_{kl}]_{kl} \in \mathbb{M}_n(V)$. Alors on aura

$$\left\| \sum_{kl} a_k v_{kl} b_l \right\| = \left\| \begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} [v_{kl}] \begin{bmatrix} b_1 & \dots & b_n \end{bmatrix} \right\| \leq N'_n([v_{kl}]).$$

□

Les propositions 4.2 et 4.3 ont comme conséquence immédiate

Corollaire 4.4. *Soit V un A - B bimodule représentable. Alors*

$$\begin{aligned} N_n(\tilde{v}) &= \sup \left\{ \left\| \sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^n a_k v_{kl} b_l \right\| : \left\| \sum_{k=1}^n a_k a_k^* \right\| \leq 1, \left\| \sum_{l=1}^n b_l^* b_l \right\| \leq 1 \right\} \\ &= \sup_{R \in \Omega_V} \| [R(v_{kl})] \|. \end{aligned}$$

La structure minimale de A - B bimodule matriciellement normé est caractérisée par le résultat suivant:

Théorème 4.5. *Soit $(V, (\|\cdot\|_n)_n)$ un A - B bimodule L^∞ matriciellement normé. Les affirmations suivantes sont équivalentes:*

- (a) *La structure matricielle de V est minimale.*
- (b) *Il existe Ω un compact et un morphisme de A - B bimodules complètement isométrique $V \rightarrow C(\Omega, \mathcal{B}(\mathfrak{H}_{B''}, \mathfrak{H}_{A''}))$.*
- (c) *Tout morphisme isométrique $j : V \rightarrow C(\Omega, \mathcal{B}(\mathfrak{H}_{B''}, \mathfrak{H}_{A''}))$ est complètement isométrique.*

(d) Pour $[v_{kl}] \in \mathbb{M}_n(V)$ on a

$$\|[v_{kl}]\|_n = \sup \left\{ \left\| \sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^n a_k v_{kl} b_l \right\| : \left\| \sum_{k=1}^n a_k a_k^* \right\| \leq 1, \left\| \sum_{l=1}^n b_l^* b_l \right\| \leq 1 \right\}.$$

(e) Pour tout $A - B$ bimodule L^∞ matriciellement normé, tout morphisme contractif de $A - B$ bimodules $W \rightarrow V$ est complètement contractif.

Démonstration. L'équivalence (a) $\Leftrightarrow$ (d) a été démontrée dans la proposition 4.3.

(a) $\Rightarrow$ (c). Pour chaque entier $n \leq 1$ définissons

$$N'_n(\tilde{v}) = \|j_n(\tilde{v})\|, \quad \forall \tilde{v} \in \mathbb{M}_n(V).$$

Alors $(V, (N'_n)_n)$ est un espace L^∞ matriciellement normé compatible avec V . Pour $\omega \in \Omega$, si on pose $R_\omega(v) = j(v)(\omega)$, alors $R_\omega \in \Omega_V$. On a

$$N'_n(\tilde{v}) = \sup_{\omega \in \Omega} \|j(v_{ij})(\omega)\| = \sup_{\omega \in \Omega} \|R_\omega(v_{ij})\| \leq N_n(\tilde{v}),$$

donc on a, pour tout entier n , l'égalité $N'_n = N_n$, c'est à dire j est complètement isométrique.

(c) $\Rightarrow$ (b). Cette implication est immédiate, car la représentation standard est une isométrie, donc par hypothèse elle doit être complètement isométrique.

(b) $\Rightarrow$ (a). Si j est un morphisme complètement isométrique de V dans l'espace $C(\Omega, \mathcal{B}(\mathfrak{H}_{B''}, \mathfrak{H}_{A''}))$, alors pour tout $\tilde{v} \in \mathbb{M}_n(V)$

$$\|\tilde{v}\|_n = \|j_n(\tilde{v})\| = \sup_{\omega \in \Omega} \|j(v_{ij})(\omega)\|.$$

Pour chaque $\omega \in \Omega$ soit $R_\omega(v) = j(v)(\omega)$. Alors $R_\omega \in \Omega_V$, donc

$$\|\tilde{v}\|_n = \sup_{\omega \in \Omega} \|R_\omega(v_{ij})\| \leq N_n(\tilde{v}).$$

(a) $\Rightarrow$ (e). Soit W un $A - B$ bimodule L^∞ matriciellement normé et soit $\Phi : W \rightarrow V$ un morphisme contractif. Alors, pour $\tilde{w} \in \mathbb{M}_n(W)$ on aura

$$\begin{aligned} N_n(\Phi_n(\tilde{w})) &= \sup_{R \in \Omega_V} \|R(\Phi(w_{ij}))\| = \sup_{R \in \Omega_V} \|(R \circ \Phi)(w_{ij})\| \\ &\leq \sup_{S \in \Omega_W} \|S(w_{ij})\|, \end{aligned}$$

et on finit en utilisant la proposition 4.2 appliquée à W .

(e) $\Rightarrow$ (a). Soit $(V, (N'_n)_n)$ un espace matriciellement normé compatible avec V . Alors l'identité $\text{Id}_V : V \rightarrow V$ est un morphisme contractif, et par hypothèse il doit être complètement contractif. Donc $(V, (\|\cdot\|_n)_n)$ est la structure minimale de $A - B$ bimodule L^∞ matriciellement normé. $\square$

Remarque 4.6. Soit $(V, (\|\cdot\|_n)_n)$ un $A-B$ bimodule L^∞ matriciellement normé. Soit k un entier. Alors $(\mathbb{M}_k(V), (\|\cdot\|_{kn})_{n \in \mathbb{N}})$ est un $\mathbb{M}_k(A) - \mathbb{M}_k(B)$ bimodule L^∞ matriciellement normé.

Comme conséquence importante des résultats précédents, on peut retrouver le théorème de représentation de $A-B$ bimodules L^∞ matriciellement normés.

Théorème 4.7 ([1, 3]). Soit V un $A-B$ bimodule équipé d'une structure d'espace d'opérateurs. Alors V vérifie les axiomes de Ruan (R1), (R2) si et seulement si il existe un espace de Hilbert $\mathfrak{H}$, deux représentations $\pi : A \rightarrow \mathcal{B}(\mathfrak{H})$, $\rho : B \rightarrow \mathcal{B}(\mathfrak{H})$ et un morphisme de $A-B$ bimodules complètement isométrique $J : V \rightarrow \mathcal{B}(\mathfrak{H})$ tels que

$$J(avb) = \pi(a)J(v)\rho(b), \quad \forall a \in A, v \in V, b \in B.$$

De plus, si $A = B$ on peut choisir $\pi = \rho$.

Démonstration. Pour chaque entier n soit $\mathcal{X}_n = \Omega_{\mathbb{M}_n(V)}$. Evidemment

$$\mathcal{X}_n = \text{End}_{\mathbb{M}_n(A), \mathbb{M}_n(B)}(\mathbb{M}_n(V), \mathcal{B}(\mathbb{C}^{n^2} \otimes \mathfrak{H}_{B''}, \mathbb{C}^{n^2} \otimes \mathfrak{H}_{A''}))_1,$$

car $\mathbb{C}^{n^2}$ est l'espace de la forme standard de $\mathbb{M}_n$.

Considérons l'application

$$j_n : V \rightarrow \mathcal{B}(K_n, H_n)$$

donnée par

$$j_n(v) = \bigoplus_{R \in \mathcal{X}_n} R(v \oplus 0),$$

où

$$\begin{aligned} K_n &= \bigoplus_{\mathcal{X}_n} (\mathbb{C}^{n^2} \otimes \mathfrak{H}_{B''}) & H_n &= \bigoplus_{\mathcal{X}_n} (\mathbb{C}^{n^2} \otimes \mathfrak{H}_{A''}) \\ v \oplus 0 &= \begin{bmatrix} v & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \in \mathbb{M}_n(V), \quad \forall v \in V. \end{aligned}$$

Evidemment j_n est un morphisme de $A-B$ bimodules. Soit $R \in \mathcal{X}_n$. Alors pour tout m entier et $[v_{ij}] \in \mathbb{M}_m(V)$, par le théorème 4.5 et la remarque 4.6 on a

$$\|[R(v_{ij} \oplus 0)]\| \leq \|[v_{ij} \oplus 0]\|_{mn} = \|[v_{ij}]\|_m,$$

donc j_n est un morphisme complètement contractif. D'autre part, j_n est n -isométrique, car pour tout $R \in \mathcal{X}_n$ et $[v_{ij}] \in \mathbb{M}_n(V)$ on a

$$\|[R(v_{ij} \oplus 0)]\| = \|R([v_{ij}])\|.$$

En fait, j_n est k -isométrique, pour $k = 1, 2, \dots, n$.

Soit

$$j = \bigoplus_n j_n.$$

Alors j est une isométrie complète de V à valeurs dans un espace $\mathcal{B}(K, H)$. Soit $\pi_n(a) = 1_{n^2} \otimes a$ et $\rho_n(b) = 1_{n^2} \otimes b$. Evidemment

$$j(avb) = \pi(a)j(v)\rho(b), \quad \forall a \in A, b \in B, v \in V,$$

où

$$\begin{aligned} \pi &= \oplus_n \oplus_{\mathcal{X}_n} \pi_n \\ \rho &= \oplus_n \oplus_{\mathcal{X}_n} \rho_n. \end{aligned}$$

Si $A = B$ il ne reste rien à démontrer, car dans ce cas notre construction est telle que $\pi = \rho$. Si $A \neq B$, en considérant l'espace $K \oplus H$, soit $J : V \rightarrow \mathcal{B}(K \oplus H)$ définie par

$$J(v) = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ j(v) & 0 \end{bmatrix}$$

et les représentations $0 \oplus \pi$ respectivement $\rho \oplus 0$. Alors J est un morphisme de $A - B$ bimodules complètement isométrique, vérifiant les conditions de l'énoncé. $\square$

5. BIMODULES NORMAUX

Définition 5.1. *Un $A - B$ bimodule représentable dual est un $A - B$ bimodule représentable tel que V est le dual d'un espace de Banach V_* et pour tout $a \in A$, $b \in B$ les applications $v \mapsto av$ et $v \mapsto vb$ sont $\sigma(V, V_*)$ continues.*

Un $A - B$ bimodule représentable dual V est dit normal à gauche (resp. à droite) si A (resp. B) est une W^ -algèbre et pour tout $F \in V_*$, l'application $a \mapsto F(av)$ (resp. $b \mapsto F(vb)$) appartient à A_* (resp. B_*). Si V est normal à gauche et à droite on dira qu'il est normal.*

Dans ce cas le lemme 2.3 peut être renforcé.

Lemme 5.1. *Soit V un $A - B$ bimodule normal à gauche (resp. à droite). Soit $F \in V^*$ avec $\|F\| \leq 1$ une fonctionnelle $\sigma(V, V_*)$ continue. Alors il existe $\phi \in S(A)$, $\psi \in S(B)$ deux états de A et B respectivement tels que*

$$|F(avb)| \leq \phi(aa^*)^{1/2} \psi(b^*b)^{1/2} \|v\|,$$

pour tout $a \in A$, $b \in B$ et $v \in V$, et tels que ϕ (resp. ψ) est normal.

Démonstration.

Supposons que V est normal à gauche et $F \in V_*$ est de norme 1. Par le lemme 2.3 il existe deux états ϕ , ψ de A et B respectivement tels que

$$|F(avb)| \leq \phi(aa^*)^{1/2} \psi(b^*b)^{1/2} \|v\|.$$

Par compacité de V_1 (la boule unité de V), il existe $v_0 \in V_1$ de norme 1 tel que $F(v_0) = \|F\| = 1$. Soit $\tau(a) = F(av_0)$. Alors $\tau \in A_*$ et en plus $\|\tau\| = 1 = \tau(1)$, donc τ est un état normal de A . On a aussi

$$\tau(a) \leq \phi(a)^{1/2}, \quad \forall a \in A^+.$$

Pour prouver la normalité de ϕ on utilise un critère connu (voir par exemple [12, Corollary III.3.11]). Considérons une famille $(p_\alpha)_{\alpha \in I}$ de projecteurs deux à deux orthogonaux dans A vérifiant $\sum_\alpha p_\alpha = 1$. Si $F \subset I$ est un ensemble fini

$$\sum_{\alpha \in F} \phi(p_\alpha) = \phi\left(\sum_{\alpha \in F} p_\alpha\right) \geq \tau\left(\sum_{\alpha \in F} p_\alpha\right)^2,$$

donc la normalité de τ implique

$$\sum_{\alpha \in I} \phi(p_\alpha) \geq 1,$$

et donc ϕ est un état normal. $\square$

Proposition 5.2. *Soit V un $A - B$ bimodule représentable dual et $F \in V_*$ avec $\|F\| \leq 1$. Alors il existe $\eta \in \mathfrak{H}_{B''}$, $\xi \in \mathfrak{H}_{A''}$ deux vecteurs de norme 1 et $R : V \rightarrow B(\mathfrak{H}_{B''}, \mathfrak{H}_{A''})$ un morphisme contractif de $A - B$ bimodules continu pour les topologies $*$ -faibles tel que*

$$F(\cdot) = (R(\cdot)\eta|\xi).$$

Si, en outre, V est normal à gauche (respectivement à droite), il existe $\eta \in \mathfrak{H}_{B''}$ (resp. $\eta \in \mathfrak{H}_B$), $\xi \in \mathfrak{H}_A$ (resp. $\xi \in \mathfrak{H}_{A''}$) de norme 1 et $R : V \rightarrow B(\mathfrak{H}_{B''}, \mathfrak{H}_A)$ (resp. $R : V \rightarrow B(\mathfrak{H}_B, \mathfrak{H}_{A''})$) un morphisme contractif de $A - B$ bimodules continu pour les topologies $$ -faibles tels que*

$$F(\cdot) = (R(\cdot)\eta|\xi).$$

Démonstration. La démonstration est analogue à celle de la proposition 2.6.

Supposons que V est un $A - B$ bimodule représentable dual normal à gauche. En tenant compte du lemme 5.1, il existe un état normal ϕ de A et un état ψ de B tels que

$$|F(avb)| \leq \phi(aa^*)^{1/2} \psi(b^*b)^{1/2} \|v\|,$$

et en considérant les représentations standard de A et de B'' respectivement, ϕ est un état vectoriel sur $\mathfrak{H}_A$ et ψ^{**} est un état vectoriel sur $\mathfrak{H}_{B''}$. Soit $\phi = \omega_\xi$ et $\psi = \omega_\eta$. Donc il existe pour chaque v un opérateur $R(v) \in \mathcal{B}(\overline{B''\eta}, \overline{A\xi})$ tel que

$$F(avb) = (R(v)b\eta, a^*\xi), \quad \forall a \in A, b \in B.$$

Evidemment $\overline{B''\eta} = \overline{B\eta}$. Il est évident que R est un morphisme contractif de $A - B$ bimodules. Il reste à démontrer que R est continu

pour les topologies $*$ -faibles, c'est à dire que si $v_\alpha \rightarrow 0$ dans la topologie $\sigma(V, V_*)$ alors $R(v_\alpha) \rightarrow 0$ dans la topologie $\sigma(\mathcal{B}(\overline{B\eta}, \overline{A\xi}), \mathcal{B}(\overline{B\eta}, \overline{A\xi})_*)$. Ceci est équivalent à démontrer que

$$R'(\mathcal{B}(\overline{B\eta}, \overline{A\xi})_*) \subset V_*,$$

où R' est la transposée de R . Mais $\mathcal{B}(\overline{B''\eta}, \overline{A\xi})_* = \mathcal{C}^1(\overline{A\xi}, \overline{B\eta})$ (les opérateurs à trace de $\overline{A\xi}$ à valeurs dans $\overline{B\eta}$), la dualité étant donnée par la trace. Comme les opérateurs de rang 1 de la forme $b\eta \otimes a\xi$ forment un ensemble total dans $\mathcal{C}^1(\overline{A\xi}, \overline{B\eta})$, il suffit de démontrer que pour tout $a \in A$ et $b \in B$, la forme linéaire $R'(b\eta \otimes a\xi)$ est $\sigma(V, V_*)$ continue. Or, pour tout $v \in V$ on a

$$\begin{aligned} \langle v, R'(b\eta \otimes a\xi) \rangle &= \langle b\eta \otimes a\xi, R(v) \rangle \\ &= \text{Tr}(R(v)(b\eta \otimes a\xi)) = (R(v)b\eta|a\xi) \\ &= F(a^*vb), \end{aligned}$$

et par hypothèse les applications F et $v \mapsto a^*vb$ sont $\sigma(V, V_*)$ continues. Pour achever la démonstration il suffit de remplacer R par l'application $UR(\cdot)V^*$, où U et V sont les deux inclusions $\overline{B\eta} \subset \mathfrak{H}_{B''}$ respectivement $\overline{A\xi} \subset \mathfrak{H}_A$. $\square$

Pour simplifier, étant donné V et W deux $A - B$ bimodules duaux, on va noter avec $\text{End}_{A,B}^w(V, W)_1$ l'ensemble des morphismes contractifs de V à valeurs dans W , continus pour les topologies $*$ -faibles.

Théorème 5.3. *Soit V un $A - B$ bimodule représentable dual. Alors*

$$\|v\| = \sup\{\|R(v)\| \quad : \quad R \in \text{End}_{A,B}^w(V, \mathcal{B}(\mathfrak{H}_{B''}, \mathfrak{H}_{A''}))_1\}.$$

Si V est normal à droite, alors

$$\|v\| = \sup\{\|R(v)\| \quad : \quad R \in \text{End}_{A,B}^w(V, \mathcal{B}(\mathfrak{H}_B, \mathfrak{H}_{A''}))_1\}.$$

Si V est normal à gauche, alors

$$\|v\| = \sup\{\|R(v)\| \quad : \quad R \in \text{End}_{A,B}^w(V, \mathcal{B}(\mathfrak{H}_{B''}, \mathfrak{H}_A))_1\}.$$

Si V est normal, alors

$$\|v\| = \sup\{\|R(v)\| \quad : \quad R \in \text{End}_{A,B}^w(V, \mathcal{B}(\mathfrak{H}_B, \mathfrak{H}_A))_1\}.$$

Démonstration. La démonstration est une application directe de la proposition précédente.

Soit $v \in V$. Supposons que V est normal à gauche, par exemple. Alors il existe une suite $(F_n)_n \subset V_*$ avec $\|F_n\| \leq 1$ telle que $\lim_n F_n(v) = \|v\|$. Par la proposition 5.2 il existe

$$R_n \in \text{End}_{A,B}^w(V, \mathcal{B}(\mathfrak{H}_{B''}, \mathfrak{H}_A))_1$$

et des vecteurs $\eta_n \in \mathfrak{H}_{B''}$, $\xi_n \in \mathfrak{H}_A$ de norme 1 tels que

$$F_n(v) = (R_n(v)\eta_n|\xi_n),$$

donc $\lim_n \|R_n(v)\| = \|v\|$. $\square$

Avec, en plus, des hypothèses de normalité, le théorème 3.3 devient

Théorème 5.4. *Soit V un $A - B$ bimodule dual. Alors il existe un espace de Hilbert H , deux représentations $\pi : A \rightarrow \mathcal{B}(H)$, $\rho : B \rightarrow \mathcal{B}(H)$ et un morphisme isométrique de $A - B$ bimodules $J : V \rightarrow \mathcal{B}(H)$ continu pour les topologies $*$ -faibles, telles que*

$$J(avb) = \pi(a)J(v)\rho(b), \quad \forall a \in A, b \in B, v \in V.$$

Si V est normal à gauche (à droite), alors on peut supposer que π (respectivement ρ) est une représentation normale

Démonstration. Supposons par exemple que V est normal à gauche. Soit $\mathcal{M}$ l'ensemble des morphismes (de $A - B$ bimodules) de V à valeurs dans $\mathcal{B}(\mathfrak{H}_{B''}, \mathfrak{H}_A)$, contractifs et continus pour les topologies $*$ -faibles. Avec les notations précédentes,

$$\mathcal{M} = \text{End}_{A,B}^w(V, \mathcal{B}(\mathfrak{H}_{B''}, \mathfrak{H}_A))_1.$$

Soit $\mathfrak{m} = \text{card}(\mathcal{M})$ et soit $K = l^2(\mathfrak{m})$. On définit

$$J : V \rightarrow \mathcal{B}(K \otimes \mathfrak{H}_{B''}, K \otimes \mathfrak{H}_A),$$

par

$$J(v) = \oplus_{R \in \mathcal{M}} R(v).$$

J est une isométrie par le théorème 5.3. Soient π et ρ les représentations de A et B dans $\mathfrak{H}_A$ respectivement $\mathfrak{H}_{B''}$. Alors

$$J(avb) = (1 \otimes \pi)(a)J(v)(1 \otimes \rho)(b), \quad \forall a \in A, b \in B, v \in V.$$

Le morphisme J est évidemment continu pour les topologies $*$ -faibles, étant une somme directe. Aussi, $1 \otimes \pi$ est une représentation normale de A , car π est normale. Le résultat s'obtient en utilisant le même argument que dans la démonstration du théorème 3.3. $\square$

Enfin, comme conséquence directe, on donne une légère généralisation d'un autre théorème de représentation de [3].

Définition 5.2. *Soit V un $A - B$ bimodule L^∞ matriciellement normé. On dit que V est un $A - B$ bimodule dual L^∞ matriciellement normé si il existe $(V_*, (\|\cdot\|_n))$ un espace L^1 matriciellement normé tel que $\mathbb{M}_n(V_*)^* = \mathbb{M}_n(V)$, pour tout entier $n \leq 1$.*

On rappelle qu'un espace vectoriel V muni d'un système de normes matricielles $(\|\cdot\|_n)$ est dit L^1 matriciellement normé s'il vérifie l'axiome (R1) de Ruan et si

$$\left\| \begin{bmatrix} \tilde{v} & 0 \\ 0 & \tilde{w} \end{bmatrix} \right\| = \|\tilde{v}\|_n + \|\tilde{w}\|_m,$$

pour tous les entiers n, m et pour tout $\tilde{v} \in \mathbb{M}_n(V)$, $\tilde{w} \in \mathbb{M}_m(V)$.

Pour un espace d'opérateurs donné V , il est possible que V possède un préduel V_* tel que la boule unité de $\mathbb{M}_2(V)$ n'est pas fermée pour la topologie générée par les seminormes de la forme

$$\begin{bmatrix} v_{11} & v_{12} \\ v_{21} & v_{22} \end{bmatrix} \mapsto \left\| \begin{bmatrix} f(v_{11}) & f(v_{12}) \\ f(v_{21}) & f(v_{22}) \end{bmatrix} \right\|,$$

où $f \in V_*$.

Remarque 5.5. *Si V est un $A - B$ bimodule dual L^∞ matriciellement normé alors pour tout entier n , le $\mathbb{M}_n(A) - \mathbb{M}_n(B)$ bimodule $\mathbb{M}_n(V)$ est dual. Si V est normal à gauche, alors $\mathbb{M}_n(V)$ est normal à gauche. La même remarque est valable pour le cas normal à droite.*

Théorème 5.6. *Soit V un $A - B$ bimodule dual L^∞ matriciellement normé. Alors il existe un espace de Hilbert $\mathfrak{H}$, deux représentations $\pi : A \rightarrow \mathcal{B}(\mathfrak{H})$, $\rho : B \rightarrow \mathcal{B}(\mathfrak{H})$ et un morphisme de $A - B$ bimodules complètement isométrique et continu pour les topologies $*$ -faibles $J : V \rightarrow \mathcal{B}(\mathfrak{H})$ tels que*

$$J(avb) = \pi(a)J(v)\rho(b), \quad \forall a \in A, v \in V, b \in B.$$

De plus, si $A = B$ on peut choisir $\pi = \rho$. Si V est normal à gauche (à droite), on peut choisir π (resp. ρ) une représentation normale.

Démonstration. La démonstration est analogue à celle du théorème 4.7. Par exemple, si V est normal à gauche, pour chaque entier n soit

$$\mathcal{X}_n = \text{End}_{\mathbb{M}_n(A), \mathbb{M}_n(B)}^w(\mathbb{M}_n(V), \mathcal{B}(\mathbb{C}^{n^2} \otimes \mathfrak{H}_A, \mathbb{C}^{n^2} \otimes \mathfrak{H}_{B''})).$$

Evidemment $\mathbb{C}^{n^2}$ est l'espace de la forme standard de $\mathbb{M}_n$. Considérons l'application

$$j_n : V \rightarrow \mathcal{B}(K_n, H_n)$$

donnée par

$$j_n(v) = \bigoplus_{R \in \mathcal{X}_n} R(v \oplus 0),$$

où

$$\begin{aligned} K_n &= \bigoplus_{\mathcal{X}_n} (\mathbb{C}^{n^2} \otimes \mathfrak{H}_{B''}) \\ H_n &= \bigoplus_{\mathcal{X}_n} (\mathbb{C}^{n^2} \otimes \mathfrak{H}_A). \end{aligned}$$

Soit $\pi_n(a) = 1_{n^2} \otimes a$ et $\rho_n(b) = 1_{n^2} \otimes b$. Alors j_n est un morphisme de $A - B$ bimodules et

$$j_n(avb) = \pi'_n(a)j_n(v)\rho'_n(b), \quad \forall a \in A, b \in B, v \in V,$$

où π'_n et ρ'_n sont des sommes directes des représentations π_n respectivement ρ_n . En particulier, π'_n est une représentation normale. Soit

$R \in \mathcal{X}_n$. Alors pour tout m entier et $[v_{ij}] \in \mathbb{M}_m(V)$, toujours en utilisant le théorème 4.5 et la remarque 4.6 on a

$$\|[R(v_{ij} \oplus 0)]\| \leq \|[v_{ij} \oplus 0]\|_{mn} = \|[v_{ij}]\|_m,$$

donc j_n est un morphisme complètement contractif. D'autre part, j_n est n -isométrique, par le théorème 5.3, car il est facile de voir que $\mathbb{M}_n(V)$ est un $\mathbb{M}_n(A) - \mathbb{M}_n(B)$ bimodule dual. Aussi, j_n est continu pour les topologies $*$ -faibles, car c'est une somme directe de telles applications.

Soit

$$j = \oplus_n j_n.$$

Alors j est une isométrie complète de V à valeurs dans un espace $\mathcal{B}(K, H)$. Evidemment

$$j(avb) = \pi(a)j(v)\rho(b), \quad \forall a \in A, b \in B, v \in V,$$

où

$$\pi = \oplus_n \pi'_n, \quad \rho = \oplus_n \rho'_n.$$

Evidemment π est une représentation normale de A . Si $A = B$ il ne reste rien à démontrer, car dans ce cas notre construction est telle que $\pi = \rho$. Si $A \neq B$, en considérant l'espace $K \oplus H$, soit $J : V \rightarrow \mathcal{B}(K \oplus H)$ définie par

$$J(v) = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ j(v) & 0 \end{bmatrix}$$

et les représentations $0 \oplus \pi$ respectivement $\rho \oplus 0$. Alors J est un morphisme de $A - B$ bimodules complètement isométrique, vérifiant les conditions de l'énoncé. $\square$

REFERENCES

- [1] E. Christensen, E. Effros, and A. Sinclair. Completely bounded multilinear maps and C^* -algebraic cohomology. *Inventiones Mathematicae*, (90), 1987.
- [2] F. Combes. Quelques propriétés des C^* algèbres. *Bull. Sc. Math.*, (94), 1970.
- [3] E. Effros and Z-J Ruan. Representations of operator bimodules and their applications. *Journal of Operator Theory*, 19(2), 1988.
- [4] E. Effros and Z-J Ruan. On the abstract characterization of operator spaces. *Proceedings of the AMS*, 119(2), 1995.
- [5] U. Haagerup. The standard form of von Neumann algebras. *Math. Scand.*, 37(2), 1975.
- [6] R. V. Kadison and K. Ringrose. Cohomology of C^* algebras I. *Acta Mathematica*, (126), 1971.
- [7] Kitchen and Robbins. Gelfand representations of Banach bundles. *Disertationes Mathematicae*, (203), 1982.
- [8] F. Lehner. $\mathbb{M}_n$ -espaces, sommes d'unitaires et analyse harmonique sur le groupe libre. PhD thesis, Université Paris VI, 1997.
- [9] G. K. Pedersen. *C^* Algebras and their Automorphism Groups*. Academic Press, 1979.

- [10] R.R. Smith. Completely bounded module maps and the Haagerup tensor product. *Journal of Functional Analysis*, (102), 1991.
- [11] Ching-Yun Suen. Completely bounded maps on C^* algebras. *Proceedings of the American Mathematical Society*, 93(1), 1985.
- [12] M. Takesaki. *Theory of Operator Algebras I*. Springer-Verlag, 1979.
- [13] G. Wittstock. Ein operatorwertiger Hahn Banach Satz. *Journal of Functional Analysis*, (40), 1981.

Adresse : INSTITUTUL DE MATEMATICĂ AL ACADEMIEI
ROMÂNE
C.P. 1-764
BUCUREȘTI
ROMÂNIA

E-mail : `cipop@stoilow.imar.ro`

Adresse actuelle : UNIVERSITÉ D'ORLÉANS
U.F.R. SCIENCES
DEPT. DE MATHÉMATIQUES
B.P. 6759 ORLEANS CEDEX 2
FRANCE

E-mail : `pop@labomath.univ-orleans.fr`